

太醫院經驗奇效良方大全

奇効良方卷之二十三

咳逆門 附論

內經云歲金太過咳逆金鬱之發咳逆少陰二氣咳逆恬人書云咳逆仲景所謂噦是也胃寒所生傷寒本虛攻其熱必噦難知云夫咳逆證恬人斷為噦逆其說似是而非蓋噦者乾嘔也若有物直出則為吐也物旋出則為嘔也嘔無物出則為噦也咳逆者或水漬於肺而心下痞或連續不已而氣逆或喜笑過多而氣噎或熱飲而錯喉而氣搶或急食乾物而氣塞皆能作咳逆之聲連續不絕俗謂之吃忒是也大抵咳逆者不順之義吃忒者差錯之義二者皆氣不得下為火熱托之而使上至咽喉中噎而止也人或以紙撚鼻噎而止或詎寃盜賊因恐而止或鼻熱悶食香而止皆抑之駭之而使氣下也千金以咳逆上氣者為病肺脉散者死是心火刑於肺金也格致餘論云吃病

氣逆也氣自臍下直衝上出於口而作聲之名也書曰火炎上東垣謂火與元氣不兩立又謂元氣之賊古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂竹茹陳皮等劑治之未審孰為降火孰為補虛人之陰氣依胃而養胃土傷損則木氣侮之矣此土敗木賊也陰為火所乘不得內守木挾相火乘之故直衝清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚也病人見此以為危證然亦有實者今以治驗略言之有一弱人暑月因大飢大怒得滯下疾渴飲蜜水滯下緩而吃作倦甚知其因下久而陰火盛以人參白朮煎湯調益原散與之數日而止又有一膏粱老人久喘病而作止不常新秋患滯下食大減至五七日後吃作脛大癢以為難以形瘦觀之尚可以人參白朮湯下大補丸以補血不數日獲安此二人虛之為也又一女子性躁味厚暑月因大怒而吃作每作則舉身跳動神昏不知問之乃暴病視其形氣俱實

遂以人參蘆煎湯飲一椀大吐頑痰數椀大許昏睡一日而安
此暴怒氣上肝主怒肺主氣經曰怒則氣逆因怒逆肝木乘火
侮肺故大作而神昏參蘆善吐痰盡氣降而火衰金氣復位
胃氣得和而解矣難知云凡人以咳逆為噦謂可下之宜調胃
承氣湯是邪氣在胃故斷之為噦是則然矣而不思咳逆者是
足陽明失下傳手太陰結人但言其火之本不言其火之標炎
上至極高之分而咳逆也合而觀之噦與咳逆同一熱也分而
言之噦為本為膽為胃為中咳逆為標為心為肺為上若標病
應見上當治標不必名噦若言作噦使後人只見膽胃本而不
見心肺標也三因云咳逆之病古人以為噦耳多因吐利之後
胃中虛寒遂成此疾亦有胃中虛膈上熱噦至八九聲相連收
氣不回者大抵傷寒久病後老人虛人及婦人產後多有此證
者皆病深之候也亦有噦而心下痞滿者有痰水所謂別無惡

候者也丹溪云吃病者氣逆也氣自臍下直衝上出於口而作聲也書曰火炎上內經曰諸逆衝上皆屬於心朱奉議首論熱降而已下豈無超額之士而極言者孰不謂之熱而有此乎至於海藏深發前人所未發故猶有陰證發之說但形證少差耳大抵治法虛則補之補中須分寒熱或因汗吐下誤服寒涼過劑當以溫而補之如脾胃陰虛火逆衝上當以平而補之挾熱者涼而補之若夫實者如傷寒失下地道不通因而咳逆當以下之如痰飲停蓄心下暴怒氣逆痰厥此等必形氣俱實別無惡候皆當隨其邪之所在而涌之泄之瀉之利之也諸論具詳皆前入所述學者當守規矩以治之

咳逆通治方

橘皮竹茹湯

治吐利後胃虛膈熱而咳逆

橘皮 三錢

竹茹 二錢

人參 二錢

甘草

右作一服水二鍾生姜五片紅棗三枚煎一鍾不拘時服

柿蒂湯 治胃膈痞滿咳逆

柿蒂 五錢 丁香 三錢

右作一服水二鍾生姜五片煎一鍾不拘時服

半夏生姜湯 治痰欲死

半夏 湯洗 生薑 五錢

右作一服水二鍾煎至一鍾分作二服不拘時服

桂苓白朮丸 治痰逆止咳嗽散痞滿壅塞開堅結痛悶進飲

食調和五臟

辣桂 乾生薑 各半 半夏 湯洗 茯苓 去皮 各

白朮 陳皮 去白 澤瀉 肥土 各

右為細末麴糊和丸如小豆大每服二三十九生薑湯下

日三服病在膈上食後服病在下食前服病在中不拘時

服一方用黃藥黃連各半兩水丸服効

小茈胡湯 治傷寒熱證咳逆嘔噦

方見傷寒門加栝蒂煎服

灸咳逆法

其法於患人乳下一指許正與乳相直骨間陷處如婦人即屈乳頭下乳頭齊處是穴灸之艾炷如小豆大灸三壯男左女右只灸一處火到肌即癢如不癢不可治也其穴當取乳下骨間動脈處是穴

丁香柿蒂散 治吐利及病後胃中虛寒咳逆至七八聲相連收氣不回者難治

丁香

柿蒂

人參

茯苓

橘皮

良姜 炒

半夏 已上各生薑半兩

甘草 三分

右為末每服三錢水一盞煎乘熱頓服或用此藥調蘇合香丸服之亦妙

治久患咳嗽連咳四五十聲者

右用生姜自然汁半合入蜜一匙同煎令熟不拘時溫服如此三四服立効

治寒氣攻胃咳嗽

右用黑豆二合炒熟內於瓶中以熱醋沃之紙封開小孔子令患人以口吸其氣入咽喉中即定

橘皮乾薑湯 治胃中有寒咳逆

橘皮

乾姜

通草

桂心

人參

甘草

各等分

右為散每服四錢水一盞半煎六分溫服日三服

羌活附子散 止咳逆

羌活

附子

炮去
皮臍

茴香

炒各
半兩

木香

丁香

乾姜

炮各
一兩

右為末每服二錢水七分盞鹽少許煎數沸空心服一方

無丁香一方用丁香不用木香

丁香散

治咳逆噎汗

丁香

柿蒂

各一

良姜

甘草

炙各
半兩

右為末每服二錢不拘時用熱湯乘熱點服

丁香柿蒂散

治諸種吃噎嘔逆痰涎

丁香

柿蒂

青皮

陳皮

各一

右以咀每服三錢水一盞半煎七分去滓不拘時溫服

治丈夫女子傷中絕脉筋急痛咳逆

右以鹿髓和熱酒服之良

治寒氣攻胃咳噎

草豇菹

去皮 益智 去皮各一兩 乾柿蒂 二兩

右咬咀每服三錢水一中盞入生姜半分煎至五分去滓不拘時熱服

治咳逆

右以蘇合香丸用丁香柿蒂煎湯化下噎逆即咳逆也乃胃寒所致良姜為要藥人參白茯苓佐之蓋良姜能溫胃能解散胃中風邪

香飲子

治咳逆不止

右用乾柿蒂十五枚為末用水一盞加白塩梅少許煎至六分不拘時溫服

葶澄茄散

治噎氣咳逆亦治傷寒咳逆日夜不定

葶澄茄

良姜 各二兩

右為末每服二錢水一盞煎六分沸投醋半盞取出呷之

治諸吃噎

橘皮

三兩湯浸
法篇別

枳殼

一兩去
穢妙

右剉碎以水二升煎至五合去滓通熱頓服

治寒氣攻胃吃噎

吳茱萸

更半兩湯浸
次焙乾微炒

青橘皮

半兩湯浸
去白焙

右以咀每服三錢水一中盞入生姜半分同煎至五分去

滓不拘時熱服

硫黃

治咳逆服藥無効者

硫黃

乳香

右各等分為末用酒煎急令患人嚥之

又方

雄黃二錢

右為末用酒一盞煎七分急令患人嚥其熱氣即止

奇効良方卷之二十三

普救良方卷之二十四

頭痛風大頭風門

附論

頭痛為病靈樞云厥頭痛取足六經手少陰其頭痛其腦盡痛
并足寒者即死不治難經曰手三陽之脈受風寒伏留而不去
則名厥頭痛入連在腦者名真頭痛內經云寸口脈中短者曰
頭痛脉經云陽弦則頭痛又云寸口脉浮中風發熱頭痛脉緊
頭痛是傷寒脉緊上寸口者凡頭痛脉訣云頭痛短瀉應須死
浮滑風痰皆易除內經云東風生於春病在肝俞在頭項故春
氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脉起於目內
眦上額交巔上入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少陽膽之
脉起於目銳眦上抵頭角病在頭角額痛夫風從上受之風寒
傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池
風府調其陰陽不足則補有餘汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛

耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上而不下頭痛巔疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半寒痛者先取手少陽上明後取足少陽上明此偏頭痛也有真頭痛者甚則入連於腦手足寒至節者且發夕死夕發且死有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓亡者以腦為至腦逆故令頭痛腦亦痛東垣云凡頭痛皆以風藥治之者揔其大体而言之也高巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛惡風脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為多少陽頭痛脈弦緩往來寒熱此明為多陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根石膏白芷為多大陰頭痛必有痰體重腹痛為痰癖其脈沉緩蒼朮半夏南星為多少陰頭痛三陰三陽經不流行兩足寒氣逆為

寒厥其脉沉細麻黃附子細辛為多厥陰頭痛項痛或痰涎沫厥冷其脉浮緩吳茱萸湯主之諸血虛頭痛當歸川芎為多諸氣虛頭痛人參黃芪為多為多者主治實藥也兼見何證以佐使藥治之此立方之大法也氣血俱虛頭痛者用調中益氣湯中少加川芎蔓荊子細辛其效不可盡述半夏白朮天麻湯治痰厥頭痛藥也清空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯治厥逆頭痛藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治所論頭痛大法甚詳著矣世之方論又言頭風病名何以此不見發明請言其略凡邪令人頭痛者其邪一也但有新久去留之分耳淺而近者名頭痛其痛卒然而至易於解散速安也深而遠者為頭風其痛作止不常愈後遇觸復發也皆當驗其邪所從來而施治之觀於試效方載案古老人壯歲時病頭痛每發時兩頰青黃暈眩自不欲開懶於言語身体沉重兀上欲吐食數

日方過乃曰此太陰厥陰合而為病名曰風痰以水煎金花九更灸俠谿二穴各二七壯不旬日愈以是觀之豈非頭風乎於此不言風者是言經之本也世言風者是言經之標乎何不明少陽厥陰頭痛者令人偏頭痛其經肝膽風木為邪也後人遂以此而名頭風可謂不求其本歟索古云夫大頭風證者是陽明邪熱太甚資實少陽相火而為之也多在少陽或在陽明或傳太陽視其腫勢在何部分隨經取之濕熱為腫木盛為痛此邪見於頭風在兩耳前後所主其病也治之大不宜藥速亡則過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命此病自外支內者是血病况頭部分受邪見於無形迹之部當先緩而後急先經者謂邪氣在上着无形之分部既着无形无所不至若用重劑速下過其病難已雖用緩藥若急服之或食前或頓服皆失緩急則藥不能除病當徐上浸漬无形之邪也或藥性味形体不

離緩脾是也、且緩急者謂緩劑已過邪氣入於中、是到陰部、染於有形質之所、若不速去、則損陰也、此終治却為客邪當急去之治客以急也、且治主病當緩者、謂陽邪在上、陰邪在下、本家病也、若急治之、不能解分而益亂也、治客以急者、謂陽分受陰邪、陰分受陽邪、此客氣急除去之也、假令少陽上明為邪出於耳之前後也、陽明為邪者、目大腫也、先以黃芩黃連甘草湯通炒煎少上不住服上畢不愈、用新瓦上炒鼠粘子待香同大黃煎去滓內芒硝俱各等分亦時上呷之、無令飲食在前得微利、則邪氣去、若陽明行經之藥、非麻葛根芍藥甘草、太陽行經羌活防風之類是也、又以東垣治驗其所論製方自有未美、天之四時民多疫癘、初竟增寒、體重次傳頭面腫盛、百不能開、上喘咽喉不利、舌乾口燥、俗云大頭天行、親戚不相訪問、慮其傳染之故、得此病者五六日、醫以承氣加藍根下之、稍緩翌日其病

如故再下之又緩終莫能愈索古謂之曰夫身半已上天之氣也身半已下地之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭目而為腫盛以承氣下之瀉胃中之實熱是誅罰無過殊不知適其所至為故遂處方用藥黃芩黃連味苦寒瀉心肺熱以為多橘紅苦平玄參苦寒生甘草甘寒人參甘溫瀉火補氣以為臣連翹鼠粘子薄荷味辛平板藍根苦寒馬勃白殭蠶味苦平散腫消毒以為佐升麻茈胡平行少陽上明二經不得伸結梗味平溫為舟楫不令下行其為細末一半用白沸湯調時上呷下一半用蜜為丸嚥化之服盡良愈如大便秘者加酒煨大黃一錢或二錢以利之腫勢甚者宜砭刺之是皆深得病機之道詳盡立論處方以為後人之規焉

頭痛頭風大頭風通治方

芎朮湯

治濕頭痛眩暈痛極

川芎

附子生去

白朮已上各錢

桂心去皮

甘草各一

右作一服水二鍾生姜七片紅棗二枚煎至一鍾食遠服

小芎辛湯 治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不止

川芎三升

細辛去

白朮

甘草各二升

右作一服水二鍾生薑五片芽茶一撮煎至一鍾食後服

川芎散 治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣上攻眼目多淚生眵及

偏正頭痛

川芎

羌胡各二

細辛

半夏麴

人參

前胡

防風

甘菊花

甘草各一錢

薄荷少許

右作一服水二鍾生姜三片煎至一盞食後服

菊花散 治風熱上攻頭痛不止

甘菊花 去枝 旋覆花 去梗 防風 去芳

枳殼 去穢

川羌活 去芳 蔓荊子 石膏

甘草 炙各半

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

通關散 治感風發熱頭痛鼻塞

枳芎 二兩 川烏 白芷 薄荷

甘草 各一兩半 川芎 一兩 細辛 半兩

右為細末每服二錢食後葱茶調下薄荷湯亦可

三生丸 治痰厥頭痛

天南星 白附子 半夏 各等分

右為細末用生薑自然汁浸蒸餅和丸如菉豆大每服五

十丸食後生薑湯送下

天香散 治年久頭風不得愈者

天南星 半夏 湯泡 川烏 去皮 白芷 各二

右作一服水二鍾入生姜自然汁小半煮一鍾食遠服
藿香散 治体虛傷風停聚痰飲上厥頭痛或偏正頭疼及治

諸風等證

草烏炮去

藿香

洗去土

川烏炮去

乳香

如皂角子

右為細末每服一錢食後薄荷湯調下

辛導痰湯

治痰厥頭痛

川芎

細辛

南星

陳皮

去白

茯苓

已上各

半夏二升

枳實

熱炒

甘草

各一

右作一服水二鍾生姜七片煎至一鍾食後服

如聖餅子

治風寒伏留陽經氣厥痰飲一切頭痛

防風

去芦

半夏生用

天麻

已上各

南星

湯泡

川烏去皮

乾姜

炮已上

川芎

甘草

炙各

右為細末滴水和捻作餅子每服三五餅食後同荊芥穗

細嚼茶酒任下一方加細辛

加減三五七散 治風寒入腦太陽頭痛

方見風門

川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞舌重

方見風門

普濟消毒飲 專治天行大頭累試神効

方見傷寒門

大川芎丸 治新沐感風名曰首風旋暈昏眩偏正頭疼

川芎四兩 天麻一兩

右為細末煉蜜和丸每兩作十九丸每服一丸細嚼茶酒任

下不拘時服

大追風散 治久新偏正頭疼肝臟久虛血氣衰弱風毒上攻

頭目眩運心煩百節痠疼鼻塞舌重項背拘急皮膚瘙癢

面上遊風狀若蟲行一切頭風兼治婦人血風攻注此藥消風化痰清利頭目

川烏炮去皮

防風

川芎

荊芥

僵蚕炒去絲

石膏煨

甘草炙已上

白附子炮

全蝎炒去毒

羌活

地龍炒去土

南星

天麻

白芷已上各

乳香研

沒藥研

草烏炮

雄黃已上各

右為細末每服半錢痛睡用細茶湯調服

急風散 治男女偏正頭疼夾腦風太陽穴痛坐卧不安

川烏生去

辰砂研各

南星生用

右為細末用酒調塗痛處小兒貼顙門

清聖膏 治偏正頭疼久不愈善療熱損目腦痛不止

羌活

防風

黃連已上各

甘草炙已上各

此胡七

川芎五

黃芩制半三及半

右為細末每服三錢用茶清少許調如膏抹口內少用白湯送下臨卧服頭疼甚加細辛二錢痰厥頭疼多加半夏偏頭疼不愈減羌活防風川芎一半加此胡

神應散

治一切頭風

光章烏

炮裂細辛五錢去上各好茶一兩

右為細末每服半錢臨卧濃茶點服

星烏散

治諸般頭風二三十年不愈者只二三服効

天南星

川烏生去皮尖

右為細末每服二錢入細茶二錢薄荷七葉鹽梅一个同

煎一二沸入生薑汁些少溫服

通頂煙

治諸頭風如斧劈痛不可忍者

川烏

右為末燒煙熏枕內熱茶清泡枕內煙氣服之大効

點頭散 治偏正頭疼

川芎二兩 香附四兩炒

右為細末每服二錢食後用茶清調服

石膏鼠粘子散 治偏正頭疼連晴疼

石膏 鼠粘子炒各等分

右為細末每服二錢食後用溫酒或茶清調服

又方 白芷須經日曬香 草烏等分炒令黃

半錢細末葱茶點 此是頭疼快捷方

又方 老少頭風總一般 良薑細辛等分僵蠶

白梅湯點三分許 總發之時服便安

芎藭丸 治偏正頭疼一邊鼻不聞香臭常流清涕或作臭氣

一陣服芎藭等分藥不効者服此不十服愈及治噴嚏稠濃

川芎

研少殊內一石膏研

片腦已上各

人參

茯苓

甘草炙

細辛已上各

犀角生用

梔子各一

阿膠炒一

麥門冬去心

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九或二丸食後細

嚼茶酒任下

青火金鉞

治頭風牙痛赤眼腦瀉耳鳴

焰硝一丸

青黛

川芎

薄荷各一

右為細末口噙水用此藥吹小痛鼻

赤火金鉞

治證同前

盆硝一兩

椎黃

乳香

沒藥

川芎

石膏已上各全蝎一對

右為細末依前法搗鼻又治暴赤眼及治蜈蚣蛇蝎傷

神聖餅子

治證同前

玄胡索

猪牙皂角

煨存性取淨末各一升

青黛半升

右為細末滴水和捻作小餅子如前以水化開用竹筒吹入鼻內男左女右吹之

白附散

治腦逆頭疼牙亦疼

白附子

一升麻黃煎去

南星

川烏已上各半及

蝎梢五个

乾姜炮

硃砂各二

麝香少許

右為細末每服二錢用溫酒調服去枕卧片時

葱附丸

治頭風疼痛

附子

去皮切

右為細末用葱涎和丸如梧桐子大每服五十九食遠用

茶清送下

升蒼荷葉散

活法機要云夫雷頭風者震卦主之諸藥不効

與證不相對也宜用此方

升麻

蒼术

製各

荷葉

針針

右劉散每服五錢水一盞半食後煎服或燒荷葉一个研

細煎調

上清散 治頭痛肩骨痛眼痛不可忍者

川芎

欒金

芍藥

荆芥穗

芒硝

已上各半

薄荷葉

乳香

沒藥

已上各半

片腦

半

右為細末每用一字鼻內搐之

麝香茶芽散

治諸般頭疼百藥不効者

麝香少許

茶芽一

刀

川芎

細辛

荆芥

川烏

甘草

已上各半

右吹咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

大芎辛湯

治一切頭痛但發熱者不宜服其餘痰厥飲厥腎

氣氣厥等證偏正頭疼不可忍者只以此藥并如聖餅子服之但多服自能作効如氣虛年高之人仁服養正丹黑錫丹并用此藥調鍾乳粉間服諸證頭疼緊捷之法元以踰此但頭疼多用石膏蓋取其能墜痰飲然恐性寒故以鍾乳粉代之腎厥頭疼尤得其治或疑鍾乳粉煨煉之藥則以軟石膏煨過為末服之亦驗

生附子

生烏頭

天南星

乾姜

細辛

川芎

已上各

甘草三分

右咬咀每服四錢水二盞生姜七片茶芽少許煎至六分去滓食前服

如中脫素寒者不用茶芽

若氣壅盛只用川芎一两細辛半兩甘草二錢煎如前法一方治頭疼細辛二錢川芎白芷減半為細末搐鼻

一方高良姜曬乾不見火碾為細末口含水少許搐鼻中
如此數次即愈久患頭疼尤能作効

一方治氣虛頭疼附子一隻生去皮臍切作片用生姜自
然汁一大盞浸一宿慢火炙乾再蘸再炙候滲盡姜汁為
度以高良姜等分為末臘茶調服名必効散

一方白芷四錢生烏頭一錢為末每服一字茶清調服有
人患眼疼先令含水以此藥搐鼻其効尤驗

川芎羌活散 治頭痛

川芎

細辛

蔓荊子

葉本已上各二刀

羌活

二刀

防風

半刀

白芷

半刀

右咬咀每服二兩水煎去滓臨卧旋服

烏頭散

治諸般頭疼不可忍者

川烏炮去

御米殼去蒂

鐵桶皮

甘草

已上各二刀

右咬咀每服三錢水一盞半煎七分去滓不拘時溫服
又方治頭痛不止

丁香一升

白芷半升

瓜蒂一升

右為細末每用半字吹入鼻中即瘥

葫蘆巴丸

治氣攻頭痛如破

葫蘆巴炒

三稜

剉醋浸

乾姜

炮各

右為細末每服二錢不拘時溫生薑湯或溫酒調服及治

瘡瘡後頭痛服之即愈

韭根丸

治頭疼眼睛如刀刺

全蠍炒

大川烏

去皮尖

右為細末用韭根取汁和丸如梧桐子大每服十五丸食

後用薄荷茶清送下

止痛太陽丹

天南星

川芎

右為細末用連翹葱白同搗爛作餅貼於太陽痛處
治氣攻頭疼不可忍者

薤麻子

乳香

右同搗爛作餅貼太陽穴上如痛定急去頂上解開頭髮
出氣即去藥一方无乳香

治頭痛不可忍者

右用蒜一顆去皮研取自然汁令病人仰卧垂頭以銅筋
點少許滴入鼻中急令搐入腦眼中決出涎

治頭痛

右用水調决明子末貼太陽穴一方作枕去頭風明目

芩辛丸

治頭痛面赤煩悶咽乾上隔風痰頭目昏運百節疼
痛項背拘急

川芎

防風

僵蚕

獨活已上各

桔梗三又

細辛

羌活

白附子

甘草已上各

天麻四又

薄荷

荆芥各半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後茶酒化下

龍珠丹

治頭痛目運及喉痺纏喉風

右於五月五日取長蛇蛻不拘多少以片腦麝香各少許

相和同研丸如麻子大每用一九以生薑汁塗鼻中逐邊

各內一九立愈

黑錫丹

治真頭痛

茴香炒

附子製

葫蘆巴

破故紙炒

川練子

巴戟已上各

肉苳蔻製

木香

沉香

桂心已上各 錫硫砂四又

右為末同研勻酒煮麪糊和丸如梧桐子大陰乾以布袋

擦令光瑩每服四十九空心姜鹽湯送下一方有陽起石
順氣和中湯

黃芪半錢

人參一錢

白芍藥使

當歸使

陳皮佐

白木

各五錢

升麻引

訖胡

引各三分

細辛使

蔓荊子使

川芎

使各二分

炙甘草

佐七分

內經曰陽氣者衛外而為固也今年高氣弱又加發汗衛
外之氣愈損故以黃芪甘溫補衛實表為君人參甘溫當
歸辛溫補氣補血芍藥酸寒收衛氣為臣白木陳皮炙甘
草苦甘溫養胃氣生發陽氣上實皮毛腠理為佐訖胡
升麻苦平引少陽陽明之氣上升通百脉灌溉周身者也
川芎蔓荊子細辛溫體輕浮清利空竅為使也
右剉如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去滓食後溫服
服之減半再服而愈明年春赴

詔至六盤出曹郎中

以古風贈云東垣李明之膏以能醫鳴易水得其訣爲竭
黃金鑪一燈靜室窮內經黃帝拊掌岐伯驚目諸月積不
易售半世豈得三折肱所長用藥有活法秘方堆案白魚
生不聞李延同君且同病一汗一下得其平乃知古人一
證處一方後世以方合證此理殊未明公心審是者誰子
直以異已喧謗聲先生飲恨卧黃壤門生賴汝卓卓醫中
英活人事業將與相一旦去已權非輕連年應召天策府
廉臺草木皆欣榮好藏漆葉青和散莫之樊阿獨植名
清上瀉火湯 燕京溫官人年小時氣弱常於氣海三里灸之
節次約五七千壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜
寒風其頭痛則愈微來暖處或見烟火其痛復作五七年
不愈此皆矣之過也

羌活根

三錢

知母

酒浸

黃芩

酒浸各

一少

黃蘗

酒浸

炙甘草

黃芪已上各一分

防風

升麻各七分

生地黃

訖胡根

甘草根

黃連酒浸

藁本

已上各五分

蔓荊子

當歸身

蒼朮

已上各三分

荊芥穗

川芎各二分

細辛

紅花各少

右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去滓稍

熱食後服

中書左丞姚公茂年六十七宿有時疾至元戊辰春因酒
再發頭面赤腫而痛耳前後尤甚胃中煩悶咽嗌不利身
半已下皆寒足脣尤甚由是以床炕相接身半已上卧於
床身半之下卧於炕飲食減少精神困弱脉得浮數按之
弦細上熱下寒明矣內經云熱勝則腫春氣者病在頭難
經云熱在頭身宜砭刺之取其易散故也遂於腫上約五
十餘刺其血紫黑如露珠之狀頃時腫痛消散又於氣海

亢中大爻炷灸百壯乃助下焦陽虛退其陰寒次於三里
二亢中各灸三七壯治足胛冷亦引導熱氣下行故也遂
慶方云熱者寒之然病有高下治有遠近无越度其側度
君以黃芩黃連苦寒酒炒亦為固用以瀉其上熱倍梗并
草辛甘溫上升佐諸苦藥以治其熱訖胡升麻苦平味之
薄者陰中之陽發散上熱以為臣連翹苦辛平以散結消
腫當歸身辛溫和血止痛大黃苦寒酒煨引苦性上行至
巔驅熱而下以為使也投劑之後腫痛全減大便利再服
減大黃慎言語節飲食不旬日良愈

既濟解毒湯

治上熱頭目赤腫而痛胃膈煩悶不得安卧身

半已下皆寒足胛尤甚大便秘

升麻

去苗

當歸身

連翹

已上各

黃芩

酒炒

黃連

酒炒

甘草

大黃

煨勿用

桔梗二紅 各

右剉如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去滓食後溫服
忌酒濕麪大料物及生冷硬物

治偏頭痛不可忍方

單麻子

半斤 剉大棗十五枚

右共搗令熟塗於紙上用筋一隻捲之去筋內在鼻中良久取下清涕即止

治偏頭疼方

欒金一顆 苦葫蘆子一合

右為細末用白絹子裹藥末一錢於新汲水內浸過滿向患處鼻中得黃水出即瘥

神效方 治偏頭風疼

右用生蘿蔔汁仰臥注鼻中左痛注右右痛注左若頭重

兩鼻皆注數十年病者用之皆効

仙靈脾浸酒方 治偏頭風手足不遂皮膚不仁

右用仙靈脾一斤細剉以无灰酒二斗浸之春五夏三秋
七冬十日取出藥每日隨性暖酒飲之常令醺上不得大
醉酒盡再合無不効合時忌鷄犬見之
一字散 治偏頭疼不可忍者

乳香 別研

延胡索

盆硝 研已上川芎二升

雄黃 別研

右為細末每用一字左疼搗左右疼搗右

飛虎散 治偏正頭疼

白附子

香白芷

荊芥穗

石膏 煨研

川芎

天麻

薄荷

防風 半已上各

蒼朮 浸

兩頭尖 用各一升

右為細末每服一錢臨卧溫茶清調服忌食熱物

千金散 治偏正頭疼

川芎

細辛

防風

井菊花

全蝎

藁本

芽茶

石菖蒲

青藤根

甘草 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半葱白一根同煎至七分去滓

食後服滓再煎如眼目疼加貫仲一兩

去落湯 治偏正頭疼頭風

麻黃

去根節人參 去芦

陳皮 去白

甘草 八分

御米殼

去穢炒黃三分

右咬咀每服五錢水一盞半生姜七片同煎至七分去滓

食遠溫服

抽刀一字散 治偏正頭痛頭風

烏頭生去皮益水浸一月取出切作片再以生薑汁洗一宿炒乾如急用只炮去皮尖

細辛川芎各半錢

右為細末每服一字食後茶清調下一方有權黃半兩

蘆薈散 治頭風頭痛

蘆薈防風去叉 丹砂研 龍腦研已上

天麻白附子炮 白芷 白朮已上各

右為細末每服半錢食後葱白薄苛茶清調下

沐頭方 治風頭痛或頭旋目眩四肢煩痛坐卧不安

蔓荊子芎藭 玄參已上各 石膏半

甘菊花葛根各三

右搗篩分作三度用每度以米泔水一斗二升煮取八升

去滓於暖室中稍熱沐頭如汗出宜避風

惡寒入篋中方 治風頭及腦掣痛不可忍者以此膏摩之

右用牛蒡莖搗取濃汁二升無灰酒一升鹽花一匙慢火同令稠成膏以摩痛處其風毒自散亦治時行頭痛摩時須極力令熱乃速効冬月無苗以根代之亦可

都梁丸

一名芷彈丸

王定国因被風吹項背拘急頭目昏眩太

陽并腦俱痛自山陽撐舟至泗州求醫楊吉老即診脉即與一丸便服王因欵話經一時再作併進二丸病若失去王甚喜問為何藥荅云公如道得其中一味即傳此方王思索良久自川芎防風之類凡舉數種皆非但一味白芷耳王益神之此藥曰初無名王曰是藥處自都梁名人可名都梁丸也大治諸風眩暈婦人產前產後乍傷風邪頭目昏重反血風頭痛服之令人目明并沐浴後服一二丸甚佳暴寒乍暖神思不清頭目昏暈並皆治之

香白芷

擇大塊白色新藥者先以微火烘去土用佛焰油洗四五次曬乾

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九多用荊芥點臘茶細嚼下食後常服百無所忌只乾嚼亦可一方如熱風冷酒調冷風熱酒調下一方細嚼川芎葱白茶清送下

大蒜搗鼻法 治頭風痛不可忍亦可搗小兒驚風
右用蒜七箇先燒地通紅掃出火將蒜去皮逐箇於紅地上磨成膏子在地上却將殭蚕一兩去嘴足安在蒜上用桃覆定四邊勿透氣來日取出只用殭蚕為末先含水一口將藥末一豆許搗於鼻內立効

枕頭方 治風頭痛百藥不差者

右用食茱萸葉細剉灑酒拌勻以絹袋盛之於甑中蒸熟乘熱分作二包更換枕之取差為度

仙方如聖餅子

草烏

羌活

半夏

天花粉

細辛

薄荷

荆芥

何首烏

防風

羌活

蒼朮

赤小豆

松香

甘松

藿香

晚蠶沙

菊花

白

甘草

赤芍藥

蔓荊子

各等分

右為細末用炒麪作糊和為餅赤土為衣每服一餅食後細嚼茶清送下

一字輕金散

治偏正頭風疼夾腦風眉稜骨痛牽引兩眼抽

掣疼痛并或生翳膜視物不明

藿香藥

荆芥穗

防風

石膏

細研水飛

旋覆花

香白芷

川芎

已上各半兩

烏

去皮尖生用

南星

各半錢

草烏

半錢

右腫乾研為細末每服一字茶後淡茶調下

清神散

麝香

片腦

雄黃

青黛

全蝎

乳香

沒藥各等分

右為細末每用少許口含水搐入鼻中

一滴金丸

治首風及偏正頭風

人中白

地龙各一分

右為細末用羊膽汁和丸如芥子大每用一丸用新汲水

一滴化開滴入兩鼻中

治頭風百藥不効者

右用天南星一兩以白礬湯泡去毒水五七次焙乾為末

分作三分每分水二盞入白梅三個同煎至一盞當發時

食後服

芎藭丸

治頭風化痰

川芎

不拘多少以淨水洗淨切作片或研或酒洗

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九不拘時細嚼用茶清或酒送下

羌活散

治頭風

羌活防風旋覆花

獨活川芎細辛牙

蔓荊子停通七味

甘草石脂各半加

中風作劉煎為妙

尋常只得點清茶

大師留下羌活散

選盡仙方不及他

治雷頭風發

雷頭風發聰斯言

半糞將來不用錢

細搗羅為極細末

溫酒調下便安然

通關散

治八般頭風

右用半夏為末同百草霜少許以紙一條入藥半錢作紙

撚子焙極乾每用藥時先含水一口將紙撚子燃着吹滅就鼻中搐之如有涎即吐出再含水再搐如此用三五次見効

太一麝香湯一名烏青散治風邪客於腦頭痛至甚及偏正頭

疼夾腦風連眉骨項頸上徹腮頰疼痛不可忍者

草烏生用一乃

新茶芽

細辛去苗各二乃

右剉如麻豆大每服三錢水一盞半入真麝香一捻同煎八分去滓熱服一方無麝香為細末茶清調下食後服

必捷散 治腦風頭痛甚者

白花蛇去骨酒浸三宿炙二兩

蘇藜炒去角一分華澄茄二十枚

白附子切作片炒乾

蔓荊子酒浸一分

右為細末每服一錢用薄荷自然汁和溫酒半盞食後調服忌發風之物

湖南押衙顏思退傳頭風掣疼

黃蠟二斤 鹽半斤

右二味相和於錫羅中鎔令相入捏作一塊盛熱可合腦

大小搭頭至額頭痛立止

全蝎散 治頭風攻注口眼不正

全蝎二枚去毒醋炙 赤足蜈蚣一條炙

麝香一字別研

辰砂一字別研

右為細末同研勻每服一字食後溫酒調服

治眉心并肩梁骨疼者

右用二陳湯煎飲下青州白丸子立驗

太醫院經驗奇效良方卷之二十四

太醫院經驗奇效良方大全卷之二十五

眩暈門

附論

丹溪論曰眩暈分之為二皆由痰火為病以此分為二哉眩暈雖屬痰火未嘗不由腎虛兼風邪所得蓋痰者本流動之物又因火動而助其愈盛火性炎上得風則愈熾風火兩動痰之愈作經云諸風掉眩皆屬肝木原病式云風火皆屬乎陽多為兼化陽主乎動而兩動相搏則為旋轉也若人患此頭旋目眩卒然惡心欲吐眼花視物不的如屋旋轉起則運倒其病所苦何經所受而致此曰靜順清謐水之化也動亂撓擾火之用也腦者地氣之所生故藏陰於目為瞳子系腎水至陰所主二者喜靜謐而惡動擾靜謐則清明內持動擾則掉搖散亂故腦轉目眩此之謂也靈樞經云五臟六腑之精氣皆上注於目為之睛也筋骨氣血之精與脉并系於目上屬於腦出於項中故邪之

中項者乘其身形之虛深則隨目系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則目系急目系急則目眩也乃心腎不交風火兼化而致然也夫風者有內外之分風從外入者則兼化也由內之散者乃火之生風也醫者察審內傷外感之由脉浮自汗項強不仁為傷風脉緊無汗筋掣痛為感寒脉虛煩悶者為暑脉沉滯吐逆者為濕寸脉俱沉此為異耳至於七情內傷者使藏氣不平鬱而生涎結而為飲隨氣上攻令人頭暈眉稜骨痛目不可開其證婦人得之蓋婦人性多偏怒經曰天之氣曰風人之氣曰怒則致傷肝木心動生風令人頭目旋運皆由此哉婦人本陰血王之因產難崩漏虧損過勞使陽氣無依為眩暈也男子患此或因金瘡吐衄便利之損或酒醉行房勞傷精血腎氣不能歸元而諸氣逆上是為頭目眩暈也學者於此當分標本別其盛衰用藥施治如鼓應桴無不效矣

眩暈通治方

半夏白朮天麻湯 治頭旋惡心煩悶氣喘短促心神顛倒兀兀欲坐目不敢開如在風雲中苦頭痛眩暈身重如山不得安卧並皆治之

半夏 一錢

白朮 二錢

天麻

茯苓 去皮

橘皮

蒼朮

人參

神麴 炒

麥藥 炒

黃芪

澤瀉 已上各一錢

乾薑

黃蘗 各半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

仙朮芩散 治風熱壅塞頭目昏眩消痰飲明耳目清神

川芎

連翹

黃芩

山梔子

菊花

防風

大黃

藿香葉

當歸

芍藥

桔梗 已上各七分

石膏

滑石錢各半

蒼朮

甘草錢各

薄荷葉

縮砂仁

荊芥

已上各四分

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

芎朮湯

治肩兩中濕眩暈嘔逆頭重不食

方見頭痛門

羚羊角散

治風邪乘於陽經上注頭目遂入於腦或痰水結

聚胃脯上衝頭目一切眩暈並皆治之

羚羊角

錢

茯神

去皮

枳殼

錢炒

甘草

炙

芎藭

已上各一錢

半夏

湯泡

防已

白芷

已上各一錢半

附子

泡去皮半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

三五七散

治陽虛風寒入腦頭痛目眩運轉如在舟車之上

耳內蟬鳴風寒濕痺脚氣緩弱等疾並皆治之

天雄皮去

細辛

洗去土各三兩

山茱萸

去核

乾薑

炮各五兩

防風去蘆

山藥

炒各七兩

右為細末每服二錢食前用溫酒調服

小芍辛湯

治風寒在腦頭痛眩暈欲倒嘔吐不定

方見頭痛門

川芎散

治風眩頭暈

川芎

甘菊花

人參

茯神

去皮

山藥

半兩上各

山茱萸

去核一兩

右為細末每服二錢用溫酒調下不拘時服日三服

人參前胡湯

治風痰頭運目眩

人參

去蘆錢

前胡

南星

湯炮

半夏麴

木香

枳殼

麴炒

橘紅

赤茯苓

紫蘇葉

甘草

炙已上各一錢半

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

川芎散 治眩暈惡風自汗或身體不仁氣上衝胃戰搖如在

舟車之上

川芎

白朮錢各三

北細辛

白茯苓

粉草

已上各錢一 桂枝半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服有痰兼

青州白丸子服之

加味二陳湯 治痰暈或因冷食所傷嘔吐不止

陳皮

白茯苓

半夏錢各三 胡椒

丁香

錢各一 甘草錢半

右作一服水二鍾生薑三片烏梅一箇煎一鍾不拘時服

芎朮除眩湯 治感濕感寒頭重眩暈

方見濕門

香橘飲 治氣虛眩暈

木香

橘皮 去白

白朮

半夏 麴

白茯苓

縮砂 已上各

丁香

甘草 炙各五分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

川芎石膏湯 治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴

方見風門

蔓荊子散 治風頭旋運悶起則欲倒

蔓荊子

甘菊花

半夏 湯泡

羚羊角屑

枳殼 麩炒

茯神 去木

芎藭

黃芩

防風 已上各三分

麥門冬 去心

石膏 各一兩

地骨皮

赤箭

細辛

甘草 炙已上各半兩

右咬咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不

拘時溫服忌熱麪飴糖羊肉

漢防已散

治上焦風痰攻注頭目旋運心神煩亂

漢防已

麥門冬

焙去心

前胡

已上一各

半夏

湯炮

旋覆花

防風

細辛

甘草

炙已上一各半兩

赤茯苓

人參

芍藥

羚羊角屑

枳實

炙炒

荆芥

已上一各

右咬咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不

拘時溫服忌飴糖羊肉

芎藭散

治諸陽受風頭目旋運目視昏暗肝氣不清

芎藭

甘菊花

各一兩

白殭蠶

炒

細辛

去葉

防風

去叉

羌活

已上一各

旋覆花

草決明

蟬蛻

洗已上一錢

天麻

蜜蒙花

荆芥穗

甘草

炙已上一各半兩

右為細末每服二錢水一盞煎七分食後溫服湯點亦可

新花九

治風頭旋目運欲倒胃中痰逆兼治筋骨疼痛

甘菊花

天麻酒浸

羌活

赤茯苓

去皮

枸杞子

防風去叉

獨活

天竺黃

另研

蔓荊子

藁本去土

芫薺

木香

各等分

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服五七

十九不拘時用荊芥湯送下

療風邪氣未除發即心腹滿急頭旋眼運欲倒

羚羊角屑

黃芩各一

杏仁

去皮尖炒

枳實

炒

芫薺

獨活

防風

白朮

已上各二兩

茯神

去木三兩

生薑

四兩

右㕮咀以水九升煮取三升去滓分作三服日三次服之

忌菹菜雀肉并蒜大酢麪等

羚羊湯

治暗風頭旋眼黑昏眩倦怠痰涎壅盛骨節疼痛

羚羊角屑

旋覆花

紫苑

去苗土

石膏

甘草

炙已上各一兩

細辛

去葉半兩

前胡

三分

犀角屑

一分

右吹咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分去

滓食後溫服

人參丸

治風頭旋目眩痰逆惡心胃膈痞滯咳嗽痰涎喘滿

嘔逆不飲飲食

人參

白朮

旋覆花

炒

甘草

炙已上各一兩

麥門冬

焙去心

枳殼

麩炒

前胡

已上各二兩

木香

半兩

右為細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五十九食後

溫生薑湯送下

芩藺散

治風頭旋眼目昏痛眩運倦怠心忪

芩藺

前胡

白殭蠶

炒

人參

已上各一兩

蔓荊子

天麻

酒浸

防風

去叉已上各半兩

右為細末每服二錢食後溫酒調下

白木飲 治風邪在胃頭旋不止復加嘔逆

白朮 厚朴去皮炙 甘菊花各半兩 防風去叉

白芷 人參已上各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片煎一盞食前溫服

防風飲子 療風痰氣發即頭旋嘔吐不食

防風 人參 橘皮已上各二兩 白朮

茯苓各三兩 生薑四兩

右剉碎以水六升煮取三升去滓分溫四服一日令盡忌

醋桃李雀肉蒜麴等物

祛痰丸 治風頭旋痰逆惡心胃膈不利

南星生 半夏生 赤茯苓去皮 陳皮去白

乾薑炮各等分

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸不拘時用溫米飲送下

松花浸酒方 治風頭旋腦皮腫痺

右以松花并臺春三月取五六寸如鼠尾者不拘多少煮細切一升用生絹囊貯以酒三升浸五日每日空心暖飲五合晚食前再服

增損黑錫丹 治陰陽不升降上熱下冷頭目眩暈病至危篤或暖上潛愈甚者

黑錫丹頭兩肉瑩

附子炮去皮破故紙炒

葫蘆巴 官桂去皮

茴香已上各一兩青皮炮

川練子

陽起石

木香

沉香已上各半兩

烏藥

礞石火煨鹽水一分

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服五七十九濃煎

人參茯苓生薑棗湯送下空心服一方無磁石

羌活湯 治風頭眩筋脉拘急痰涎壅滯肢節煩疼

羌活 前胡去苗 石膏碎 白茯苓去皮

芎藭 根洗 黃芩去黑心 甘菊花

防風 細辛去葉 甘草炙 蔓荊子

麻黃去根節黃掠去沫

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片雞蘇三葉同煎至七

分去滓不拘時服

沉香磁石丸 治上感下虛頭目眩運耳鳴耳聾

沉香別碎 蔓荊子 青鹽別研 甘菊花已上各

巴戟去心 胡蘆巴 山藥炒 磁石火煨醋淬

川椒去目 山茱萸去核 陽起石火煨 附子炮去皮

右為細末用酒煮米糊和丸如梧桐子大每服五十九粒

至七十九空 心用益湯送下

菊花散 治一切風頭目昏眩面浮腫

菊花 旋覆花 牛旁子 羌活

獨活 甘草炙各等分

右咬咀每服五錢水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

人參湯 治風頭眩但覺地屋俱轉目閉不開

人參 白朮 當歸酒洗 麥門冬去心

防風已上各兩 獨活去苗 官桂去皮 黃芪切焙

芍藥已上各一兩半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫服

守中丸 治風頭眩腦轉目系急忽然倒仆

人參 白朮 甘菊花 枸杞子

山芋已上各兩 白茯苓去皮 麥門冬去心 生地黃切焙

右為細末先用生地黃汁於銀器內入酥三兩白蜜三兩同煎逐旋掠取汁上金花令盡得五升許於銀器內拌炒前七味藥漸漸令盡候乾入白蜜同搗數千杵丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒送下服百日後五臟充滿肌膚滑潤此藥須擇四季旺相日或甲子日脩合亦名五芝地仙金髓丸

瓜蒂神妙散 治頭目昏眩偏正頭痛等疾

瓜蒂

煇硝

雄黃

道人頭

即蒼耳

川芎

薄荷

藜蘆

已上各一分

天竺黃

一錢半如無以鬱金花代之

右為細末口含水鼻中搐一字神驗

小三五七散

治頭風目眩耳聾

天雄

三兩一方用附子

山茱萸

去核五兩薯蕷七兩

右為細末每服五分不拘時溫酒調下如不見効稍加一分或煎薑棗湯調服亦可

芎歸湯 治去血過多頭重目昏眩運不省舉頭欲倒惟脉獨

弱預見崩疾

大川芎

大當歸

去尾各三兩

右咬咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服
治風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語似澀一身動搖
右以烏驢頭一枚擇洗如法蒸令極熟細切更於鼓汁內
煮著五味調點少酥食之効

天南星丸

治風虛痰頭目旋運肢節拘急

天南星

附子

炮去皮

白附子

炮

華陰細辛

旋覆花

半夏

湯炮

苦菊

半兩

天麻

一兩

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服三十丸加至五十

九不拘時用荊芥薄荷煎湯送下

麝香天麻丸 治風痰氣厥頭疼目眩旋運四肢倦怠精神不

爽睡眠不寧

麝香

二錢研

天麻

酒浸

防風

芫荽

已上各

一兩

甘菊花

三分

南星

一枚重一兩者先用白礬湯浸洗七次然後用水煮令軟切片焙乾

右為細末煉蜜和丸如鷄頭實大每服一九不拘時細嚼

荊芥湯送下

大芎辛湯

治氣虛痰飲腎虛諸厥頭痛及眩暈舉頭似屋宇

旋轉如在舟中此乃風痰虛三證宜服此藥

方見頭痛門

欒金散

治頭痛眩運

欒金

滑石

川芎

各等分

右為細末每服一二錢空心用蘼汁調服此木欒達之

法也若胃中有宿痰宜瓜蒂散吐之

神芎散 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞并牙關悶痛

川芎

麝香

荊芥

薄荷

紅豆各等分

右為細末入盆研勻鼻內搐之力慢加藥

愈風餅子 治風眩運或先服吐藥次服此藥

川芎

白芷

防風

甘菊花

細辛

羌活

天麻

荊芥穗

薄荷

甘草

炙已上兩川烏鹽去皮

右為細末湯浸蒸餅和捏作餅子每服三五餅食後細嚼

用茶清或白湯送下

玉液湯 治七情所傷氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩運心嘈脘

悸眉稜骨痛

半夏

肥大者六錢湯泡七次切作片

右作一服水一鍾半生薑十片煎至八分去滓入沉香末少許不拘時溫服

芎藭散

治風頭眩發則心腹滿急眼運欲倒

芎藭

赤茯苓

去皮

枳殼麩炒各三分

羚羊角屑

獨活

防風

白朮

黃芩

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒黃已上各半兩

右咬咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

天麻羌活丸

治頭目風眩邪氣鼓作時或旋運

天麻

羌活

白芷

藁本

去苗土

芎藭

芍藥

細辛

麻黃

已上各二兩

牛黃

別研

麝香

別研各一分

右為細末煉蜜和丸如皂角子大每服一二丸不拘時研
薄奇酒下

太醫院經驗奇効良方大全卷之二十五